

◎グリセリン浣腸液 50% [外]

【重要度】 【一般製剤名】グリセリン (U) Glycerin 【分類】グリセリン製剤

【単位】◎60mL/本 [50%], △50mL [S タイプ] /本

【用法】10～150mL (増減)

【透析患者への投与方法】常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (5)

【特徴】直腸内に注入すると直腸を刺激し、腸管の蠕動を亢進させ、また浸透作用により糞便を軟化する。S タイプは挿入チューブが 6cm と短く、直腸穿孔のリスクが小さいと考えられる。

【安全性に関する情報】急性腎不全に関連した 2 症例 (小松俊哉, 他: 日腎会誌 59: 761, 2017)

【効果発現時間】15min～1hr (U)

【備考】腸管内出血、腹腔内炎症のある患者、腸管に穿孔またはそのおそれのある患者には禁忌 (腸管外漏出による腹膜炎の誘発、蠕動運動亢進作用による症状の増悪、グリセリンが吸収され溶血による腎不全を起こすことがある)。

【更新日】20200706

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。