

○ニコチン酸アミド散 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ニコチン酸アミド（ナイアシン）（ビタミン B3） Nicotinamide (Niacin) 【分類】ニコチン酸アミド製剤

【単位】○10%散

【常用量】25～200mg/日

水疱性類天疱瘡に対する治療薬の1つとして500～2000mg/日（日本皮膚科学会：類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む）診療ガイドライン2017）

【用法】

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】食事療法で改善しないナイアシン欠乏症（ペラグラ）に使用。NAD や NADP となりエネルギー代謝に関与。VLDL 合成を抑制して TC, LDL-C, TG を低下させる。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【吸収】消化管から急速に吸収（1）

【F】

【tmax】

【代謝】トリプトファンからも合成される（U）急速に代謝される（U）

【排泄】

【t1/2】ナイアシン 45min（U）

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】122.12

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20230422

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。