▼バスタレルＦ錠　［内］

【重要度】★　【一般製剤名】トリメタジジン塩酸塩　Trimetazidine Hydrochloride　【分類】虚血性心疾患治療剤
【単位】▼3mg/錠
【常用量】１回3mg，１日３回
【用法】１日３回
【透析患者への投与方法】
【保存期CKD患者への投与方法】高齢者，腎機能低下患者でAUC増大（Nenchev N, et al: Drug Dev Res 2020 PMID: 32128844）
【特徴】
【主な副作用・毒性】頭痛，倦怠感，ふらつき，消化器症状，過敏症など
【安全性に関する情報】抗酸化ストレス作用により水銀による腎毒性を軽減（Hazelhoff MH, et al: Pharmacology 2021 PMID: 33849026）
【F】
【tmax】2hr（1）
【代謝】グルクロン酸抱合を受ける（1）
【排泄】尿中未変化体排泄率60%［po，48hrまで］（1）
【t1/2】11.5hr（1）
【蛋白結合率】
【Vd】
【MW】339.26［salt］
【透析性】
【O/W係数】
【pKa】4.86
【肝障害患者への投与方法】
【小児CKD患者における報告】
【妊婦・授乳婦への投薬】
【主な臨床報告】
【更新日】20240821

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。