

▼ビルテブソ点滴静注 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 ビルトラルセン Viltolarsen 【分類】 デュシエンヌ型筋ジストロフィー治療剤

【単位】 ▼250mg/V [5mL]

【常用量】 80mg/kg を週 1 回, 1 時間かけて静脈内投与

【用法】 生食で 100mL になるように調製

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 デュシエンヌ型筋ジストロフィーの原因遺伝子であるジストロフィンのエクソン 53 を標的とするアンチセンス核酸。女性を対象とした臨床試験は実施していない。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】 ピロガロールレッド法による尿蛋白検査で偽陽性を示す (1)

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】 尿中未変化体排泄率 92% [iv, 24hr まで] (1)

【t1/2】 2.5hr (1)

【蛋白結合率】 40% (1)

【Vd】

【MW】 6924.82

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20200521

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。