

▼ルコナック爪外用液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ルリコナゾール Luliconazole 【分類】爪白癬治療剤

【単位】▼3.5g/本 [5%, 4mL]

【常用量】1日1回、爪全体に塗布

【用法】新しい爪が生え替わるまで継続（最大48週までの使用経験）

■経口抗真菌薬との同時治療は不要

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】イミダゾール系の爪白癬治療剤。

【主な副作用・毒性】皮膚症状、爪変色及びその周囲の皮膚変色（日光で皮膚黄染）

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】354.28

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20230608

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。