

▼オラビ錠口腔用 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 ミコナゾール Miconazole 【分類】

【単位】 ▼50mg/錠

【常用量】 1回1錠, 1日1回, 原則14日間まで

【用法】 上顎歯肉（犬歯窩）に付着して適用（6時間以上保持）

乾いた手で取り出し、刻印のない面（曲面）を上顎歯肉に置き30秒間上唇の上から指で軽く押しながら保持して付着させる。

次の付着部位は反対側に変える

【透析患者への投与方法】 常用量（1）

【保存期CKD患者への投与方法】 常用量（1）

【特徴】 口腔粘膜付着型の口腔咽頭カンジダ症治療薬。湿度の影響を受けやすいためボトル包装品のまま交付。

【主な副作用・毒性】 味覚異常, 消化器症状, 適用部位異常, 食欲不振など。義歯には付きにくい。

【安全性に関する情報】

【tmax】 14hr（1）

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 416.13

【透析性】 除去されない（1）

【薬物動態】 ミコナゾール参照

【相互作用】 CYP3A及びCYP2C9を阻害（1）

【更新日】 20230608

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。