

▼エクロックゲル [外]

【重要度】 【一般製剤名】 ソフピロニウム臭化物 【分類】 原発性腋窩多汗症治療薬 [抗コリン薬]

【単位】

【常用量】

1本には14日分(28回分)

【用法】

使用前に、腋窩(わき)の水気をタオルなどでよく拭き取ります。ボトルからキャップと塗布具(アプリーケーター)を外し、ポンプ1押し分の薬液をアプリーケーターに乗せ、片方のわき全体に塗布してください。もう一方のわきにも同様にポンプ1押し分の薬液を塗布します。

3.

使用後にアプリーケーターに残った薬液は、ティッシュペーパーなどで拭き取るか、水で洗い流してください。

4.

薬液を直接手に乗せて塗布しないでください。手に薬液が付着した場合は、絶対に顔や目を触らず、すぐに手を洗ってください。薬液が目に入った場合はまぶしさや刺激を感じる場合があります。慌てず、すぐに水で洗い流してください。

5.

わきに薬液を塗った後は、乾くまで寝具や衣服に触れないように注意してください。塗り忘れを防ぐために、起床時や入浴後など、薬を塗るタイミングを決めておきましょう

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 汗を分泌するエクリン汗腺の受容体をブロックすることで過剰な発汗を抑制。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【E】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【備考】 アルコール含有のため火気注意

【更新日】 20220622

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。