

▼ジェセリ錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ピミテスピブ Pimtespib 【分類】抗悪性腫瘍剤 [HSP90 阻害剤]

【単位】 ▼40mg/錠

【常用量】 1日1回 160mg、「5日間連続投与し2日間休薬」を繰り返す

■適宜減量

【用法】 1日1回空腹時

【透析患者への投与方法】腎機能障害はPKに影響しない (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎機能障害はPKに影響しない (1)

【特徴】がん化学療法後に増悪した消化管間質腫瘍 (GIST) に適用されるストレス蛋白 HSP90 の形成を阻害してアポトーシスを誘導する低分子薬物。

【主な副作用・毒性】重度の下痢、眼障害、出血、味覚障害、腎機能障害、消化器症状、肝機能異常、皮膚障害、倦怠感、貧血など多数

【安全性に関する情報】消化器毒性、肝・腎障害、夜盲などが特徴的 (1)

【F】

【tmax】

【代謝】CES1 で代謝 (1)

【排泄】尿中未変化体排泄率 2.2% [po, 24hrまで] (1)

【CL/F】4.39L/hr (1)

【t1/2】11hr (1)

【蛋白結合率】93.1～93.6% [Alb] (1)

【Vd/F】70.2L/body (1)

【MW】454.53

【透析性】除去率は高くないと思われる (5)

【O/W 係数】

【相互作用】CYP3A, MATE1, MATE2-K を阻害 (1)

【主な臨床報告】

【更新日】20230705

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負いません。最新の情報については各薬剤の添付文書やインターネットフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断複数・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。