

▼モイゼルト軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ジファミラスト Difamilast 【分類】アトピー性皮膚炎治療薬 [PDE4 阻害剤]

【単位】▼0.3%・▼1% [1本 10g]

【常用量】

■成人：1%製剤を1日2回

■小児：0.3%製剤を1日2回 [症状に応じ1%製剤使用可]

【用法】1日2回 適量を患部に塗布■皮疹の面積0.1m²あたり1gをめやすに

■効果評価は4週間

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】親油性と親水性のバランスを考慮した低分子量のアトピー性皮膚炎治療の外用剤。PDE4 サブタイプB への選択性が高い、(PDE4-D が悪心、嘔吐に関連)。炎症性サイトカインのTNF- α やIL-4を抑制し、抗炎症サイトカインのIL-10を強化。皮膚感染部位を避けて使用。

【主な副作用・毒性】色素沈着障害、毛包炎、そう痒症、膿痂疹、ざ瘡、接触皮膚炎

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】20hr (1)

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児CKD患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20220628

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。