

▼ボカブリア錠 [内], ▼ボカブリア水懸濁注 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 カボテグラビルナトリウム Cabotegravir Sodium 【分類】

【単位】 ▼30mg/錠, ▼400mg/2mL, ▼600mg/3mL

【常用量】 1日1回30mg [リルピビリン塩酸塩と併用]

注射：600mg 筋注後、1か月に1回400mg、または600mg 投与1か月後に600mg 投与し、2か月に1回600mg 筋注

【用法】 臀部筋注

【透析患者への投与方法】 PKは検討されていない (1) 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 PKは腎機能低下の影響を受けない (1) 常用量 (5)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 肝機能障害, DIHS, 精神神経症状, 消化器症状, 皮膚症状, 倦怠感, 筋肉痛など (リルピビリン製剤併用時)

【安全性に関する情報】

【F】 75.6% [対筋注] (1)

【tmax】 2~3hr [po] (1)

【代謝】 UGT1A1, 1A9 でグルクロン酸抱合 (1) 寄与率 UGT1A1 : 67%, UGT1A9 : 33% (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 0%, 尿中回収率 27% (1)

【t1/2】

【蛋白結合率】 99%超 (1)

【Vd/F】 12.3L/body (1)

【MW】 427.33

【透析性】 除去されない (1)

【O/W 係数】

【相互作用】 OAT1/3 を阻害し, MTX の血中濃度上昇の可能性 (1) UGT1A1 誘導剤の影響を受ける (1) 多価カチオンは経口剤の吸収阻害 (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20240731

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。