

△ゼビアックス ローション [外]

【重要度】 【一般製剤名】 オゼノキサシン Ozenoxacin 【分類】 キノロン系外用抗菌剤

【単位】 △10g/ボトル [2%]

【常用量】 適量を1日1回患部に塗布 [ざ瘡に対しては洗顔後]

【用法】 1日1回

※14歳以上に適用

●表在性皮膚感染症：1週間で効果判定

●ざ瘡：4週間で効果判定（炎症性皮疹が消失した場合には中止）

【透析患者への投与方法】 常用量（1）

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量（1）

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【吸収】 経皮吸収は低い、（1）

【F】

【tmax】

【代謝】 主に CYP3A4 により代謝（1）

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 363.41

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20220714

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。