

▼ソーティクツ錠 [内]

【重要度】	【一般製剤名】デュークラバシチニブ Deucravacitinib	【分類】TYK2 阻害剤
【単位】	▼6mg/錠	
【常用量】	6mg/日	
【用法】	1 日 1 回	
24 週以内に効果判定		
【透析患者への投与方法】		
【保存期 CKD 患者への投与方法】		
【特徴】		
【主な副作用・毒性】		
【安全性に関する情報】		
【F】		
【tmax】	3hr (1)	
【代謝】	CYP1A2, CES, UGT1A9 で代謝 (1) CYP1A2 により生成する N-脱メチル化体には活性があるが、活性本体は未変化体 (1)	
【排泄】	尿中に未変化体として 13%, 代謝物として 37%回収 (1)	
【CL/F】	16.13L/hr [po] (1)	
【t1/2】	9.88hr (1)	
【蛋白結合率】	81.6% (1)	
【Vd】	140L/body [iv] (1) BBB を通過しない (1)	
【MW】		
【透析性】	ほとんど除去されない (1)	
【O/W 係数】		
【相互作用】	BCRP, OATP1B3 を阻害 (1)	
【肝障害患者への投与方法】		
【小児 CKD 患者における報告】		
【妊婦・授乳婦への投薬】		
【主な臨床報告】		
【更新日】	20230412	

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。