

▼バクニューバンス水性懸濁注シリンジ [注]

【重要度】 【一般製剤名】 沈降 15 価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体） Pneumococcal 15-valent Conjugate Vaccine 【分類】 細菌ワクチン類

【単位】 ▼0.5mL/シリンジ

【常用量】

【用法】

- ・ニューモバックス未接種：バクニューバンスを接種し 1～4 年後にニューモバックスを接種
- ・ニューモバックス接種済み：1 年以上間をおいてバクニューバンスの接種を考慮。5 年後に再度ニューモバックスを接種

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 キャリアタンパク質結合 15 価（プレベナー13+2 価）ワクチンで、65 歳からのニューモバックス NP の定期接種に先行して接種し、より強い免疫を誘導することを期待。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20230916

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。