

○オプソ内服液 [内]

【重要度】 【一般製剤名】モルヒネ塩酸塩水和物 Morphine Hydrochloride Hydrate 【分類】癌疼痛治療剤 [強オピオイド]

【単位】○5mg (2.5mL) /包, ▼10mg (5mL) /包

【常用量】モルヒネとして 30~120mg/日 (導入は少量から)

レスキューは1日モルヒネ量の1/6を目安に

【用法】定期内服は1日6回(4時間ごと)、就寝前の投与は2回分を合わせて投与可

レスキューは頓用

【透析患者への投与方法】

【保存期CKD患者への投与方法】

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W係数】

【相互作用】ナルメフェン塩酸塩水和物併用禁忌 [μ受容体拮抗作用] (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児CKD患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20230620

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。