

▼メトジェクト皮下注シリンジ [注]

【重要度】★★★

【透析患者に投与禁忌】

【一般製剤名】メトトレキサート

Methotrexate

【分類】抗リウマチ剤

【単位】▼7.5mg [0.15mL]・▼10mg [0.20mL]・▼12.5mg [0.25mL]・▼15mg [0.3mL] /Syr

【常用量】7.5mg/週，増量は2.5mg ずつ，最大 15mg

経口からの切り替えでは週あたりの使用量により換算あり 7.5～12.5mg/週の範囲

【用法】大腿部，腹部，上腕部のいずれかに皮下注

注射部位は毎回変更

【透析患者への投与方法】禁忌（1）

【保存期 CKD 患者への投与方法】eGFR 30mL/min/1.73m² 未満には禁忌，eGFR 60 未満は慎重投与に該当，投与可能であれば 7.5mg/週で開始（日本リウマチ学会，MTX 使用と診療の手引き 2023）

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20230622

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。