

▼レクビオ皮下注シリンジ [注]

【重要度】 【一般製剤名】 インクリシランナトリウム Inclisiran Sodium 【分類】 持続型 LDL コレステロール低下 siRNA 製剤

【単位】 ▼300mg/Syr

【常用量】 1回 300mg を初回, 3 ヶ月後に皮下注し, 以後 6 ヶ月毎に皮下注 [原則スタチン併用]

家族性高コレステロール血症, 高コレステロール血症で, CV イベントリスクが高く, スタチンで効果不十分かスタチン治療が選択できないケースに適用 (LDL-C 70 未満を目標)

【用法】 皮下注

【透析患者への投与方法】 腎機能低下例では血中濃度は高くなるが, 常用量の適用が可能と思われる (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 腎機能低下例では血中濃度は高くなるが, 常用量の適用が可能と思われる (5)

【特徴】 PCSK9 mRNA を標的とした二本鎖の低分子干渉リボ核酸 (siRNA)。センス鎖に結合する 3 分岐型 N-アセチルガラクトサミンを介して肝臓に取り込まれ, 肝臓の PCSK9 mRNA の分解を促進し, 肝細胞上の LDL 受容体の発現が増加し LDL-C の取り込みが促進され, 血中 LDL-C 値は低下。

【主な副作用・毒性】 注射部位反応, 注射部位紅斑, 肝機能障害

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】ヌクレアーゼで加水分解を受ける (1)

【排泄】尿中未変化体排泄率 16% [sc] (1)

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 17,284.72

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20240626

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。