

△エクラー plaster [外]

【重要度】 【一般製剤名】 デプロドンプロピオン酸エステル Deprodone Propionate 【分類】 外用副腎皮質ホルモン剤

【単位】 $\Delta 20 \mu \text{g/cm}^2$ [7.5cm×10cm] /枚

【常用量】 患部に応じて貼付

【用法】 12～24 時間枚に貼りかえ（夜間のみ貼付のこともある）

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 緑内障, 感染症, 皮膚の異常など

【安全性に関する情報】 原則, 感染部位には使用しない (1)

【吸収】 C_{max} 12hr (1)

【F】

【 t_{max} 】

【代謝】

【排泄】

【 $t_{1/2}$ 】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20231017

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。