

▼ザビセフタ配合点滴静注用 [注]

- 【重要度】★ 【一般製剤名】セフトアジジム水和物+アビバクタム Na Ceftazidime Hydrate/Avibactam Sodium 【分類】βラクタマーゼ配合第3世代セフェム
- 【単位】▼CAZ 2g+AVI 0.5g/V
- 【常用量】1回 2.5g, 1日 3回
- 腹膜炎, 腹腔内膿瘍, 胆嚢炎, 肝膿瘍に対してはメトロニダゾール注射液と併用
- 【用法】2時間かけて点滴静注
- 【透析患者への投与方法】1回 0.9375g を2日に1回 [CAZ として 0.75g を2日に1回] (1)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】Ccr 31～50 : 1回 1.25g を1日 3回, Ccr 16～30 : 1回 0.9375g を1日 2回, Ccr 6～15 : 1回 0.9375g を1日 1回 (1)
- 【特徴】
- 【主な副作用・毒性】ショック, アナフィラキシー, CD 腸炎, AKI, 血球減少, 肝機能障害, 間質性肺炎, 精神神経症状など
- 【安全性に関する情報】
- 【F】
- 【tmax】
- 【代謝】
- 【排泄】
- 【t1/2】
- 【蛋白結合率】
- 【Vd】
- 【MW】CAZ 水和物 636.65/アビバクタム Na 287.23
- 【透析性】一部除去される (1)
- 【O/W 係数】
- 【肝障害患者への投与方法】
- 【小児 CKD 患者における報告】
- 【妊婦・授乳婦への投薬】
- 【主な臨床報告】
- 【更新日】20240914

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。