

▼レズロック錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ベルモスジルメシル酸塩 Belumosudil Mesilate 【分類】 選択的 ROCK2 阻害剤

【単位】 ▼200mg/錠

【常用量】 200mg/日 [最大 400mg 分2]

【用法】 1日1回食後 (増量時1日2回)

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 T 細胞受容体シグナル伝達を含む T 細胞免疫応答の調整、細胞骨格系再構築及びエフェクター T 細胞の機能獲得におけるシグナル伝達経路にある ROCK2 のキナーゼ活性を阻害。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【吸収】 空腹時投与で吸収低下 (1)

【F】 63.7% (1)

【tmax】 2~4hr (1)

【代謝】 主に CYP3A4 で代謝 (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 0% (1)

【t1/2】 6.4hr (1)

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 548.61

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20240625

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。