

## ▼エブギーザ点滴静注液 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 エビナクマブ (遺伝子組換え) Evinacumab (genetical recombination) 【分類】

【単位】

【常用量】 15mg/kg を 4 週に 1 回

【用法】 60 分以上かけて点滴静注 [要フィルター]

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 肝臓におけるリポタンパクリパーゼ及び内皮リパーゼを阻害する ANGPTL3 への抗体で、超低比重リポタンパクのクリアランスを促進して LDL 受容体の有無と関係なく LDL-C 値を低下。ホモ接合体家族性高コレステロール血症に適用。

【主な副作用・毒性】 Infusion reaction

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 14.9 万

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20240626

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。