

▼アムノレイク 錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】タミバロテン Tamibarotene 【分類】再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤 [レチノイド]

【単位】▼2mg/錠

【常用量】6mg/m² (BSA) /日 (分2) 骨髄寛解が得られるまで [最大8週間]

【用法】1日2回 朝・夕食後

【透析患者への投与方法】設定されていない (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎障害に注意して適用 (1)

【特徴】トレチノインによる APL の分化誘導療法の再発例に適用される合成レチノイド。光に不安定

【主な副作用・毒性】関節痛・骨痛、分化症候群、感染症、白血球増加症、間質性肺疾患、縦隔炎、横紋筋融解症、血栓症、毛包炎、消化器症状など

【安全性に関する情報】

【吸収】空腹時投与でやや吸収が落ちる可能性 (1)

【F】95% [イヌ] (1) 腸肝循環する [ラット] (1)

【tmax】2～4hr (1)

【代謝】主に CYP3A4 で代謝 (1)

【排泄】主に糞便中排泄 [ラット] (1)

【t1/2】4hr (1)

【蛋白結合率】99% [Alb] (1)

【Vd】

【MW】351.45

【透析性】資料なし (1) 除去されないと思われる (5)

【O/W 係数】854 [1-オクタノール/buffer, pH 7.07] (1) pKa 2.80 (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】HCC の増殖抑制効果 (Kanai F, et al: Hepatol Int 2014 PMID: 26202410)

IL-17A の抑制を介した腎線維化の抑制 (Li L, et al: Ren Fail 2020 PMID: 33213229)

【更新日】20240821

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の新付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。