

▼ケサンラ点滴静注液 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 ドナネマブ Donanemab 【分類】 ヒト化抗N3pGアミロイドβモノクローナル抗体製剤

【単位】 ▼350mg/V

【常用量】 1回 700mg を 4 週間隔で 3 回, その後は 1 回 1400mg を 4 週間隔

6 か月毎を目安に諸検査を実施

▼アミロイドβプラークの除去が確認された場合はその時点で終了

▼アミロイドβプラークの除去が確認されない場合は最長 18 か月で終了. それ以上は慎重に判断

【用法】 30 分以上かけて点滴静注

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制

【主な副作用・毒性】 アミロイド関連画像異常 (ARIA) (浮腫/滲出液貯留, 脳微小出血・脳表へモジデリン沈着症, 脳出血), Infusion reaction, アナフィラキシー, 悪心, 頭痛

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】 ペプチド, アミノ酸に分解される (1)

【排泄】

【CL】 0.0255L/hr (1)

【t1/2】 11.8 日 (Gueorguieva I, et al: Clin Pharmacol Ther 2023 PMID: 36805552) 12.1 日 (1)

【蛋白結合率】

【Vd】 血漿量に類似 (1)

【MW】

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20241114

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報は各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。