

○プレベナー20 水性懸濁注 〔注〕

【重要度】 【一般製剤名】肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197 結合体 Prevenar20 Suspension Liquid for Injection 【分類】肺炎球菌ワクチン
【単位】○0.5mL シリンジ
【常用量】

※販売がプレベナー13 から 20 に置き換えられる

【用法】
【透析患者への投与方法】
【保存期 CKD 患者への投与方法】
【特徴】

PPSV23 の定期接種を妨げないように、本剤を先に接種し、6 か月～1 年の間隔をあけて PPSV23 を接種する方法も考慮される。PPSV23 接種からは1 年以上あける。

【主な副作用・毒性】
【安全性に関する情報】
【F】
【tmax】
【代謝】
【排泄】
【t1/2】
【蛋白結合率】
【Vd】
【MW】
【透析性】
【O/W 係数】
【肝障害患者への投与方法】
【小児 CKD 患者における報告】
【妊婦・授乳婦への投薬】
【主な臨床報告】
【更新日】 20241012

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。