

△アストミン錠 [内]

- 【重要度】 【一般製剤名】ジメモルファンリン酸塩 Dimemorfan Phosphate 【分類】非麻薬鎮咳剤
- 【単位】△10mg/錠
- 【常用量】1回10～20mg, 1日3回
- 【用法】1日3回
- 【透析患者への投与方法】
- 【保存期CKD患者への投与方法】
- 【特徴】
- 【主な副作用・毒性】食欲不振, 口渇, 悪心, 眠気, めまいなど
- 【安全性に関する情報】
- 【F】
- 【tmax】1～2hr (1)
- 【代謝】側鎖の酸化により代謝され, グルクロン酸抱合される (1) 代謝物に活性なし (1)
- 【排泄】尿中未変化体排泄率2%以下 (1) 代謝され尿中に60%回収 (1)
- 【t1/2】
- 【蛋白結合率】
- 【Vd】
- 【MW】353.39 [salt]
- 【透析性】
- 【OW係数】
- 【肝障害患者への投与方法】
- 【小児CKD患者における報告】
- 【妊婦・授乳婦への投薬】
- 【主な臨床報告】
- 【更新日】20250324

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。