

△アレジオン眼薬クリーム [外]

【重要度】 【一般製剤名】エピナスチン塩酸塩 Epinastine Hydrochloride 【分類】アレルギー性結膜炎治療薬
【単位】△2g/本
【常用量】適量を1日1回上下眼薬に塗布（目のまわりのまぶたに塗る）

片目に0.5FTU（1.3cm＝30mg）程度使用
【用法】1日1回（入浴後や洗顔後・就寝前など）
使用量にもよるが、片目に0.5FTUの場合1本で1ヵ月間程度使用可能
他の点眼薬や眼軟膏を使用する場合は最後に塗布

【透析患者への投与方法】常用量（5）
【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量（5）
【特徴】
【主な副作用・毒性】
【安全性に関する情報】
【F】
【tmax】
【代謝】
【排泄】
【t1/2】
【蛋白結合率】
【Vd】
【MW】
【透析性】
【O/W 係数】
【肝障害患者への投与方法】
【小児 CKD 患者における報告】
【妊婦・授乳婦への投薬】
【主な臨床報告】
【更新日】20250405

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。