

## ▼リバルエンLA パッチ [外]

【重要度】 【一般製剤名】リバスチグミン Rivastigmine 【分類】アルツハイマー型認知症治療剤

【単位】 ▼25.92mg・▼51.84mg/パッチ

【常用量】 1回 25.92mg から開始, 原則として 4 週後に 1 回 51.84mg (維持量) とする

【用法】 1 枚を 3~4 日枚に貼り替え (週 2 回・曜日固定) 背部, 上腕部, 胸部のいずれか

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 週 2 回貼り替えのリバスチグミン製剤。最長 4 日間貼付できる。

【主な副作用・毒性】 QT 延長, 房室ブロック, 脳卒中, 痙攣, 消化管出血, 失神, 幻覚, 貼付部位異常など

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】 エステラーゼにより加水分解, 硫酸抱合 (1)

【排泄】 尿中回収率 90%以上 [主に代謝物と思われる] (1)

【t1/2】

【蛋白結合率】 36~48% (1)

【Vd】 資料なし (1)

【MW】 250.34

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20250531

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報は各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。