

▼トロズルピ点滴静注用 [注] ？

- 【重要度】 【一般製剤名】サシツズマブ ゴビテカン（遺伝子組換え） Sacituzumab Govitecan（Genetical Recombination） 【分類】抗悪性腫瘍剤 [抗 TROP-2 抗体トポイソメラーゼ I 阻害剤複合体]
- 【単位】 ▼200mg/V
- 【常用量】 1回 10mg/kg, 21 日間を 1 サイクルとし、各サイクルの 1 日目及び 8 日目に投与 [適宜減量]
- 【用法】 3 時間で点滴静注 [2 回目以降は 1～2 時間点滴可]
- 【透析患者への投与方法】
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】
- 【特徴】
- 【主な副作用・毒性】
- 【安全性に関する情報】
- 【F】
- 【tmax】
- 【代謝】
- 【排泄】
- 【t1/2】
- 【蛋白結合率】
- 【Vd】
- 【MW】
- 【透析性】
- 【O/W 係数】
- 【肝障害患者への投与方法】
- 【小児 CKD 患者における報告】
- 【妊婦・授乳婦への投薬】
- 【主な臨床報告】
- 【更新日】 20250515

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。