

△グラアルファ配合点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 リパスジル塩酸塩水和物 / ブリモニジン酒石酸塩 Ripasudil Hydrochloride Hydrate / Brimonidine Tartrate 【分類】 Rho キナーゼ阻害薬/α2 作動薬配合剤 [緑内障・高眼圧症治療剤]

【単位】 △5mL/本

【用法】 1回1滴 1日2回点眼

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 Rho キナーゼ阻害と α2 アドレナリン受容体作動薬の配合点眼液。

【主な副作用・毒性】 α2 作動剤の全身投与時と同様の副作用 (眠気、めまい、徐脈、低血圧等) に注意

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20250617

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。