

△ネバナック懸濁性点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 ネパフェナク Nepafenac 【分類】 非ステロイド性抗炎症点眼剤

【単位】 △0.1% 5mL

【常用量】 手術前日より1回1滴, 1日3回点眼. 手術日は術前3回, 術後1回点眼

【用法】 用時よく振り混ぜてから点眼

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 加水分解により生成するアンフェナクが COX 阻害による PG 生合成を阻害する. 眼科手術後の炎症に対する抗炎症効果を有し, 白内障手術後の嚢胞様黄斑浮腫 (CME) 発症を抑制する.

【主な副作用・毒性】 角膜潰瘍, 角膜穿孔, 眼の症状, 過敏症, 頭痛など

【安全性に関する情報】 ベンザルコニウム塩化物含有のためソフトコンタクトレンズ不可 (1)

【代謝】 点眼投与後角膜を透過し加水分解酵素によりアンフェナクへと代謝 (1)

【MW】 254.28

【更新日】 20250705

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。