

▼カムザイオスカプセル [内]

【重要度】 【一般製剤名】 マバカムテン Mavacamten 【分類】 肥大型心筋症治療剤 [選択的心筋ミオシン阻害剤]

【単位】 ▼1mg・▼2.5mg・▼5mg/Cap

【常用量】 2.5mg/日から開始, 適宜増減 [最大15mg]

中等度～強い、CYP2C19 阻害剤または中等度～弱い、CYP3A4 阻害剤併用時（あるいは誘導剤の減量または中止する場合は1段階減量

【用法】 1日1回

最大耐用量にて6か月間治療で継続の判断

【透析患者への投与方法】 PKに影響なし (1)

【保存期CKD患者への投与方法】 PKに影響なし (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】 推定85% (1)

【tmax】

【代謝】 主にCYP2C19, 3A4で代謝 (1) 血中では主に未変化体として存在 (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率3% [po] (1)

【CL/F】 1.4L/hr (1)

【t1/2】 216hr (1)

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 273.33

【透析性】

【O/W係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児CKD患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20251002

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。