

## ▼エアウィン皮下注用 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 ソタテルセプト (遺伝子組換え) Sotatercept (Genetical Recombination) 【分類】 アクチビンシグナル伝達阻害剤

【単位】 ▼45mg・▼60mg/V [過剰充填バイアル]

【常用量】

【用法】

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 ヒトアクチビン受容体 IIA 型 (ActRIIA) の細胞外ドメインとヒト IgG1 の Fc 領域を結合した遺伝子組換え融合タンパク質。アクチビン A 及びその他の TGF- $\beta$  スーパーファミリーリガンドと結合するアクチビンシグナル伝達阻害剤し、肺血管平滑筋細胞の増殖を抑制。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】 異化される (1)

【排泄】 分解され排泄 (1)

【t1/2】 21 日 (1)

【Vd】 Vc 3.6L/body (1)

【MW】 約 89,000

【透析性】 除去されない (1)

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20250804

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。