

▼リブマール内用液 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 マラリキシバット塩化物 Maralixibat Chloride 【分類】 回腸胆汁酸トランスポーター阻害剤

【単位】 ▼10mg/mL [30mL ボトル]

【常用量】

【用法】

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 回腸胆汁酸トランスポーター (IBAT) の阻害剤で、回腸末端部の管腔内で作用し IBAT を介した胆汁酸の再吸収を阻害することで胆汁酸の腸肝循環を阻害。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】 ほとんどが糞便中に主に未変化体として排泄 (1)

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20250804

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。