

▼ボルゾイ錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ボルノレキサント水和物 Vornorexant Hydrate 【分類】 オレキシン受容体拮抗薬

【単位】 ▼2.5mg・▼5mg・▼10mg/錠

【常用量】 5mg/日 [最大10mg]

中程度のCYP3A阻害剤併用時、中等度肝機能障害患者は2.5mg/日

【用法】 1日1回寝る前

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】 常用量 (1) 腎障害はPKに影響しない (1)

【特徴】 デュアルオレキシン受容体 (OX1/OX2) の拮抗薬。睡眠潜時を短縮し、睡眠効率を改善。

【主な副作用・毒性】 傾眠、悪夢、倦怠感、浮動性めまいなど

【安全性に関する情報】

【吸収】 食後投与でtmax 1時間遅れる (1)

【F】 Fは不明も、82%以上が吸収される (1)

【tmax】 0.5hr (1)

【代謝】 CYP3A4で代謝 (1)

【排泄】 尿中に未変化体は排泄されない (1)

【CL/F】 9.14 L/hr (1)

【t1/2】 2.1hr (1)

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W係数】

【相互作用】 CYP3A4の阻害剤併用禁忌あり (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児CKD患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20251215

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。