

## ▼ネフィー点鼻液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 アドレナリン Adrenaline 【分類】 アナフィラキシー補助治療剤

【単位】 ▼1mg・▼2mg/キット

【常用量】 体重 30kg 未満：1 回 1mg

体重 30kg 以上：1 回 2mg

効果不十分な場合：1 回目から 10 分以降を目安に 2 回目の投与可（同一鼻孔に投与）

※既往があるか、アナフィラキシーのおそれがある場合に、最大 1 回 2 本処方。

【用法】 1 回鼻腔内投与

使用後は使用した容器を持参の上、医療機関を受診

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 アナフィラキシー時に用いるアドレナリンの鼻腔投与剤。エピペンの代替。

使用説明書の添付、使用期限の確認、使用時の回収、不要時の医療機関等への返却、処方医への受講の必要性などが規定されている。

【主な副作用・毒性】 肺水腫、血圧の異常上昇、呼吸困難、心停止、鼻部不快感、咽喉刺激感、動悸、頻脈、頭痛など

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【主な臨床報告】

【備考】 本人以外から使用されてもそれは医行為には当たらないため、本人以外から投与できる

薬剤師は、登録医（e-learning 受講して登録）の確認するための登録がある

【更新日】 20260423

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。