▼ザズベイカプセル　[内]

【重要度】　【一般製剤名】ズラノロン　Zuranolone　【分類】抗うつ薬［アロプレグナノロン様 GABAA 受容体機能賦活剤］
【単位】▼30mg/Cap
【常用量】30mg/日，14 日間
再治療時は投与終了から 6 週間以上の間隔をあける
【用法】夕食後
【透析患者への投与方法】設定されていない（1）
【保存期 CKD 患者への投与方法】AUC1.5 倍程度に上昇するため要注意（1）
【特徴】内因性神経活性ステロイドであるアロプレグナノロン注と同様に，ポストシナプス領域内外の GABA 作動性クロライドイオンチャネル受容体に結合し，GABA の作用を増強し，鎮静，抗不安，抗うつ効果を示す．
【主な副作用・毒性】
【安全性に関する情報】
【吸収】食後で F 上昇（1）
【F】18～53%［ラット］（1）
【tmax】5hr（1）
【代謝】主に CYP3A で代謝．活性代謝物なし（1）
【排泄】尿中回収率 41.2%，未変化体は排泄されない（1）
【CL/F】32L/hr（1）
【t1/2】14hr（1）
【蛋白結合率】99%［主に Alb］（1）
【Vd/F】500L/body 程度と大きい（1）
【MW】409.56
【透析性】資料なし（1）除去されないと思われる（5）
【O/W 係数】4.3［オクタノール/水］（1）
【主な臨床報告】
【更新日】20260715

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。