

## ▼ザズベイカプセル [内]

【重要度】 【一般製剤名】ズラノロン Zuranolone 【分類】抗うつ薬 [アロプレグナノロン様 GABAA 受容体機能調節剤]

【単位】▼30mg/Cap

【常用量】30mg/日, 14日間

再治療時は投与終了から6週間以上の間隔をあける

【用法】夕食後

【透析患者への投与方法】設定されていない (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】AUC1.5 倍程度に上昇するため注意 (1)

【特徴】内因性神経活性性ステロイドであるアロプレグナノロン注と同様に、ポストシナプス領域内外の GABA 作動性クロライドイオンチャネル受容体に結合し、GABA の作用を増強し、鎮静、抗不安、抗うつ効果を示す。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【吸収】食後で F 上昇 (1)

【F】18~53% [ラット] (1)

【tmax】5hr (1)

【代謝】主に CYP3A で代謝。活性代謝物なし (1)

【排泄】尿中回収率 41.2%、未変化体は排泄されない (1)

【CL/F】32L/hr (1)

【t1/2】14hr (1)

【蛋白結合率】99% [主に Alb] (1)

【Vd/F】500L/body 程度と大きい (1)

【MW】409.56

【透析性】資料なし (1) 除去されないと思われる (5)

【O/W 係数】4.3 [オクタノール水] (1)

【主な臨床報告】

【更新日】20260314

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。