

▼イムルリオ錠 [内]

- 【重要度】 【一般製剤名】イムルネストラントトシル酸塩 Imlunestrant Tosilate 【分類】抗悪性腫瘍剤 [抗エストロゲン剤]
- 【単位】▼200mg/錠
- 【常用量】
- 【用法】
- 【透析患者への投与方法】
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】
- 【特徴】
- 【主な副作用・毒性】
- 【安全性に関する情報】
- 【F】10.5% (1)
- 【tmax】
- 【代謝】主にグルクロン酸抱合 (1)
- 【排泄】尿中未変化体排泄率 0.278% (1)
- 【CL/F】166L/hr (1)
- 【t1/2】30hr (1)
- 【蛋白結合率】99.9%以上 (1)
- 【Vd/F】4310L/body (1)
- 【MW】696.71
- 【透析性】
- 【O/W 係数】
- 【肝障害患者への投与方法】
- 【小児 CKD 患者における報告】
- 【妊婦・授乳婦への投薬】
- 【主な臨床報告】
- 【更新日】20260811

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。