

▼ソルコセリル注 [注] (販売中止)

【重要度】 【一般製剤名】 幼牛血液抽出物質 【分類】 組織機能賦活剤
【単位】 ▼2mL・▼4mL/A
【常用量】 1日2～4mL
【用法】 筋注又は静注
【透析患者への投与方法】 透析患者の投与方法に言及した文献なし (5)
【保存期 CKD 患者への投与方法】 腎不全患者の投与方法に言及した文献なし (5)
【特徴】 ミトコンドリアの呼吸を促進し、ATP 産生を高め組織機能を賦活。
【主な副作用・毒性】 ショック, 悪寒, 悪心・嘔吐, 胸内苦悶, 発汗, 血圧低下など
【排泄】 尿中回収率 80% [ラット] (1)
【透析性】 不明 (5)
【TDM のポイント】 TDM の対象にならない
【更新日】 20220720

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。