

◎猪苓湯エキス顆粒（40）〔ツムラ〕 〔内〕

- 【重要度】 【分類】 漢方製剤
- 【単位】 ◎2.5g/包
- 【常用量】 7.5g/日
- 【用法】 分3 〔食前又は食間〕
- 【透析患者への投与方法】 常用量（1）
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量（1）
- 【特徴】 茯苓，猪苓，阿膠，滑石，沢瀉からなる本方は尿路の炎症を治し，利尿を円滑にする効があり，体質に関わらず頻尿，残尿感，排尿痛，血尿等の排尿障害のある場合に用いる．そのため膀胱炎，尿道炎，淋疾，尿路結石，腎盂炎，腎炎等に用いる．
- 【主な副作用・毒性】 発疹、発赤、掻痒感、胃部不快感
- 【更新日】 20151130

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。