

△トパレジック軟膏 [外] <販売中止>

【重要度】 【一般製剤名】 スプロフェン suprofen 【分類】 非ステロイド系 消炎・鎮痛外用剤

【単位】 △10g/本 [1%]

【用法】 適量を1日1～数回患部に塗布する。

【特徴】 湿疹・皮膚炎群に、特に掻痒感が強く高齢者に好発する皮脂欠乏性湿疹に適応を持つ。帯状疱疹にすぐれた鎮痛効果を持つ。ステロイド使用が好ましくない疾患に有用である。

【主な副作用・毒性】 発赤、刺激感、紅斑、そう痒

【代謝】 血中にはスプロフェンとその抱合体、2- [p-(α-ヒドロキシ-2-テニル)フェニル] プロピオン酸が検出 (1)

【排泄】 尿中回収率6.2% (1)

【t1/2】 3hr (1)

【MW】 260.31

【備考】 眼科用に使用しない。

【更新日】 20240321

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。