

▼アドソルビン原末 [内]

【重要度】【透析患者に投与禁忌】 【一般製剤名】天然ケイ酸アルミニウム natural aluminum silicate 【分類】消化管用吸着剤

【単位】▼g

【常用量】3～10g/日

【用法】分3～4（消化酵素剤やビタミンなどを吸着するために食前または食間に服用する）

【透析患者への投与方法】禁忌 [長期投与によりアルミニウム脳症・骨症が現れることがある] (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】長期投与によりアルミニウム脳症、骨症が現れることがあるため慎重投与 (1) 定期的に血中アルミニウム、リン、カルシウム、アルカリフォスファターゼ等の測定を行う (1)

【特徴】多孔性の物質であり、吸着作用及び被膜形成作用がある。腸管からは吸収されず、胃及び腸管内の異常有害物質、過剰の水分又は粘液等を吸着、除去するとともに腸壁を被覆し保護する。この吸着作用は腸管内では収斂作用、止瀉作用をあらわす。

【主な副作用・毒性】嘔吐、胃部膨満など

【安全性に関する情報】出血性大腸炎の患者、腸閉塞のある患者では病状を悪化させるおそれがあるので禁忌 (1)

【相互作用】ロペラミドとの併用によりロペラミドが吸着して効果が減弱するおそれがあるので、投与間隔をあけるなど注意 (1) キノロン、テトラサイクリンの吸収阻害 (1)

【更新日】20160204

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。