

◎八味地黄丸エキス顆粒 (7) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 腎機能、生殖器の衰えを目標にして用いる方剤。下半身の疲労脱力、多尿、頻尿、尿減少、腰痛などを目標として用いる。食欲不振、下痢、悪心・嘔吐などのあるものには用いない方がよい。前立腺肥大症に伴う排尿障害のうち冷えが強く、下肢のしびれや浮腫を伴い、下腹部に力がない場合に適用されることが多い。

【主な副作用・毒性】 胃腸障害、過敏症、肝機能障害、心悸亢進、のぼせ、舌のしびれなど

【更新日】 20151201

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。