

◎パロス発泡顆粒 [内]

【重要度】 【一般製剤名】炭酸水素ナトリウム、酒石酸 【分類】X線診断二重造影発泡剤

【単位】◎g

【用法】透視開始に際して造影剤開始投与直前あるいは投与開始後、年齢、胃内容積の個人差、造影の体位に応じて、約100～400mLの炭酸ガスの発生量に相当する量を少量の水又は造影剤と共に経口投与する。

【特徴】胃の二重撮影時に、胃内に炭酸ガスを発生させて胃を膨張し、胃内粘膜を適度に緊張させ、粘膜ヒダ間隙に硫酸バリウム懸濁液を付着させる。微細な病変の発見、診断に有用である

【主な副作用・毒性】消化器症状、おくび

【更新日】20121017

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。