

▼プロテアミン 12 注射液 [注]

【重要度】【透析患者に投与禁忌】 【分類】 総合アミノ酸製剤

【単位】 ▼200mL/袋

【常用量】 1 回 200mL

【用法】 200mL あたり 2 時間かけて点滴静注 ■TPN に配合して持続点滴も可

【透析患者への投与方法】 高窒素血症を誘発するおそれがあるため重篤な腎障害のある患者には禁忌 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 腎障害が悪化する恐れがあるため慎重投与 (1) 重篤な腎障害のある患者には高窒素血症が悪化、または誘発される恐れがあるため禁忌 (1)

【特徴】 必須アミノ酸と 8 種の非必須アミノ酸 10 種を配合したアミノ酸輸液。ナトリウム、クロール濃度は共に約 150mEq/L である。

【主な副作用・毒性】 悪心・嘔吐、腹部膨満感、便秘、胸部不快感、血圧上昇

【更新日】 20170128

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。