

## ▼アルロイヤー点鼻液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル (U) beclometasone dipropionate 【分類】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

【単位】▼50 $\mu$ g噴霧 [8.5mg/瓶]

【常用量】両鼻に1噴霧ずつ, 1日4回 (400 $\mu$ g/日) [最大16吸入]

【用法】1日4回鼻腔内に噴霧吸入■初回使用時のみ空打ちを行う

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】アレルギー性鼻炎, 血管運動性鼻炎に適用される局所ステロイド噴霧剤. 局所作用が強く, 全身作用は弱い.

【主な副作用・毒性】眼圧亢進, 緑内障, カンジダ感染, 鼻腔刺激感, 鼻出血, 咽頭刺激感, 頭痛, めまい, 高血圧

【モニターすべき項目】副腎機能, 耳鼻科的検査

【吸収】吸入後, 鼻粘膜・気道・消化管から吸収される (1)

【代謝】咽頭から吸収される10~25%は肺で, 嚥下された75~90%中の消化管吸収されない10%は消化管にあるエステラーゼで急速に加水分解されベクロメタゾンモノプロピオネートとなる. 嚥下されたのち消化管吸収されると肝で初回通過効果を受けて非活性化化合物になる (1,U) 代謝物の17-BMPは親化合物よりステロイド活性が弱い (11)

【排泄】排泄は糞便中及び尿中で12~15% (U) 尿中未変化体排泄率10~15% [po], 糞便中排泄率50~64% [po] (11)

【t1/2】15hr (U)

【蛋白結合率】87% (1,U) アルブミン, transcortin と結合 (U)

【MW】521.04

【O/W 係数】2.7 [1-オクタノール水系, pH7] (1)

【効果発現時間】通常5~7日. 患者により2~3週間要することもある (U) 【最大効果発現時間】患者により3週間以内

【更新日】20150625

※正確な情報を掲載するように努力していますが, その正確性, 完全性, 適切性についていかなる責任も負わず, いかなる保証もいたしません. 本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし, それらを利用した結果, 直接または間接的に生じた一切の問題について, 当院ではいかなる責任も負わないものとします. 最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください.

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます. すべての内容は, 日本国著作権法並びに国際条約により保護されています.