

▼ボスミン外用液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】エピネフリン (U) Epinephrine 【分類】血管収縮止血剤

【単位】▼0.1% [1mg/mL]

【用法】添付文書参照

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】気管支喘息に吸入、局所麻酔薬に添加して作用時間の延長を図る。また本剤そのままか、5～10倍希釈液を直接塗布、点眼、点鼻もしくは噴霧するかタンポンとして用いる。

【主な副作用・毒性】肺水腫等の全身作用、血清カリウム値の低下 (外国)、顔面紅潮、血圧変動、頭痛、発汗、振戦、神経過敏

【TDM のポイント】TDM の対象にならない

【備考】ジェットネブライザーもしくは超音波ネブライザーにより5～10倍生食希釈液を吸入して口頭～気管支浮腫に用いることができる (5) 防腐剤としてクロロブタノール含有 (1) 清潔に扱い、開封後2か月を目安に交換 (ICT)

【更新日】20230516

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。