

---

◎ボラザG坐剤, ○ボラザG軟膏 [外]

---

【重要度】 【一般製剤名】トリベネシド+リドカイン Tribenoside/Lidocaine 【分類】痔核局所治療剤

【単位】◎個, ○2.4g/本

【用法】1回1個, 1日2回朝・夕, 肛門内に挿入

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【特徴】創傷治癒促進作用・抗浮腫作用を有するノンステロイド剤。表面麻酔剤のリドカインを配合。高齢者などの慢性的な患者にも効果が高い。

【主な副作用・毒性】発疹、掻痒感、局所の刺激感、下痢

【排せ】尿中に25%回収 (1)

【MW】トリベネシド478.58, リドカイン234.34

【備考】室温 (27℃未満) で先端を下にして保管する (1)

【更新日】20230606

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。