

---

◎ポビドンヨード液・▼イソジン液 ・◎ポビドンヨードスクラブ・▼イソジンスクラブ [外]

---

【重要度】 【一般製剤名】ポビドンヨード povidone iodine 【分類】外用消毒剤

【単位】◎250mL/液 [10%], ◎500mL/スクラブ [7.5%]

【用法】皮膚、粘膜の消毒に使用■スクラブ：手術・皮膚の消毒には適量を用い少量の水を加えて摩擦し、良く泡立たせた後流水で洗う。手術野の消毒には塗布するか又は少量の水を加えて摩擦し、泡立たせた後滅菌ガーゼで拭う。スクラブは損傷・創傷皮膚及び粘膜には使用しない

【特徴】効力が持続的で抗生物質耐性菌にも強い殺菌性を示し、刺激性がない。抗菌スペクトルが広い割に毒性が低い。有機物で不活性化され易いことと着色が生じることが難点。希釈液は24時間が使用期限。

【主な副作用・毒性】ショック・アナフィラキシー、過敏症、接触性皮膚炎、甲状腺ホルモン異常

【更新日】20161201

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。