透析患者に関する薬剤情報

医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科

\triangle マーズレン S 配合顆粒・ \blacktriangledown 配合錠 ES [内]

【重要度】 【一般製剤名】水溶性アズレン+L-グルタミン Azulene Sulfonate Sodium/L-Glutamine 【分類】胃炎・潰瘍治療剤

【単位】△0.67g/包, ▼ES 錠

【常用量】1.5~2g/日

【用法】分3~4(空腹時の食間服用が望ましい)

【透析患者への投与方法】常用量(5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量(5)

【特徴】潰瘍組織の保護、再生作用を示す L·グルタミンと、炎症抑制作用、ヒスタミン遊離阻止作用、肉芽新生・上皮形成促進作用を示すアズレンスルホン酸ナトリウム水和物の配合剤. 作用は局所性のため粘膜に薬物が接触する必要がある.

【主な副作用·毒性】発疹, 蕁麻疹, 掻痒感, 肝機能障害, 悪心, 嘔吐, 便秘, 下痢, 胃部不快感など

【tmax】 0.5hr [グルタミン] (1) 5hr [アズレン] (1)

【代謝】 CYP に影響しない (1)

【t1/2】アズレン:13hr (1)

【蛋白結合率】資料なし(1)

【Vd】資料なし(1)

【MW】309.36 (アズレン), 146.14 (グルタミン)

【透析性】資料なし(1)

【O/W 係数】資料なし(1)

【更新日】20250524

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適別性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間路がに生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の高付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無期転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法が以て国際条約により保護されています。