

◎ミケラン点眼液・△LA点眼液 [外]

【重要度】 【一般製劑名】カルテオロール塩酸塩 (U) carteolol hydrochloride 【分類】緑内障・高眼圧症治療劑 [β遮断薬]

【単位】◎2% [5mL/本]・△1% [5mL/本], △LA2% [2.5mL/本]

【常用量】1回1滴

【用法】1日1~2回点眼 [1%製劑で十分な効果が得られない場合に2%製劑を用いる]

【特徴】本劑はアドレナリン性β受容体遮断薬を主成分とした水性点眼液である。

【モニターすべき項目】眼圧

【Tmax】15min [点眼, 健常人] (1) 単回点眼: 30min, 反復点眼: 2hr [原発開放隅角緑内障又は高眼圧症の患者] (1) 【Cmax】両眼に20μLずつ点眼した場合1.33ng/mL [健常人] (1) 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症の患者に単回投与: 1.180ng/mL, 1日2回8週投与: 3.198ng/mL (1)

【代謝】CYP2D6で代謝 (1)

【排世】尿中未変化体排世率16% [点眼, 24hrまで] (1)

【t1/2】13.8hr [点眼後] (1)

【MW】328.83

【効果発現時間】30~90min (1)

【効果持続時間】約8時間 (1)

【更新日】20140501

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬劑の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。